

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 11 พฤศจิกายน 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12261

หน้า: 13(ขวา)

Col.Inch: 21.69

Ad Value: 19,521

PRValue (x3): 58,563

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมปศุสัตว์แจง 10วันคุมอยู่หมัด โรคคอบวมพราชีวิตควายเชียงราย

กรมปศุสัตว์แจง 10วันคุมอยู่หมัด โรคคอบวมพราชีวิตควายเชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศแจ้งเตือนเหตุกระบือตายจำนวนมากในท้องที่หมู่ 1 ด.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งจากการตรวจสอบคาดว่าสาเหตุจากโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย หรือโรคคอบวม ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงในกระบือ โดยเป็นโรคสัตว์ที่ไม่ติดคน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจของสัตว์ปกติ ซึ่งสัตว์จะไม่แสดงอาการป่วย แต่เมื่อมีภาวะทำให้สัตว์เครียด เช่น ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว สัตว์จะแสดงอาการป่วยและขับเชื้อออกมาในสิ่งแวดล้อมผ่านสิ่งขับถ่ายต่างๆ และปนเปื้อนในอาหารและน้ำ เมื่อสัตว์อื่นมาสัมผัสเชื้อทำให้สัตว์ป่วยและเกิดการแพร่กระจายของโรค

ดังนั้น เพื่อลดความเสียหายจากโรคระบาดดังกล่าว และควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้ 1.เก็บตัวอย่างชิ้นโรค ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการ

ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 2.ประกาศเขตสงสัยโรคระบาดในพื้นที่เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยและสัตว์ในพื้นที่ 3.ทำบ้านทึบสังกักกระบือในพื้นที่พบโรคทั้งหมด 4.รักษากระบือป่วยด้วยยาปฏิชีวนะ ร่วมกับการรักษาทางอาการ

5.จัดชุดเฉพาะกิจออกรักษาและฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 6.ตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์ 7.ฉีดวัคซีนกับสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค 8.ควบคุมการทำลายซากกระบือให้ถูกสุขลักษณะ 9.ทำลายเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง 10.เฝ้าระวังเชิงรุกทางอาการ 11.แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เฝ้าระวังโรคดังกล่าว หากพบกระบือแสดงอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์คาดว่าจะสามารถคุมการระบาดของโรคได้ภายใน 10 วัน และดำเนินการเฝ้าระวังโรคต่อเนื่องอีก 21 วัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากโรค